

Consignes concernant la COVID-19 à l'intention des Service de garde éducatif à l'enfance

Possible changement à venir pour cette consigne

Quoi faire si mon enfant âgé de 6 mois à 5 ans a des symptômes?

Mon enfant a un ou plusieurs des symptômes suivants :



Fièvre

Enfant de 0 à 5 ans

- Température rectale de 38,5 °C (101,3 °F) et +



Symptômes généraux

- Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Grande fatigue
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Mal de tête



Symptômes respiratoires

- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Mal de gorge



Symptômes gastro-intestinaux

- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Maux de ventre



Si les symptômes débutent à la maison

- J'avise le service de garde.
- Je garde **mon enfant à la maison**.
- **J'observe** ses symptômes pour **24 heures**.
- Si mon enfant a des **symptômes** et qu'il doit passer un **test de dépistage**, tout autre enfant de la maisonnée, **âgé de moins de 5 ans**, doit aussi rester à la **maison, jusqu'au résultat du test**.



Si les symptômes débutent au service de garde

- Le service de garde communique avec moi afin que j'aie **chercher mon enfant**.
- Je garde **mon enfant à la maison**.
- **J'observe** ses symptômes pour **24 heures**.
- Si mon enfant a des **symptômes** et qu'il doit passer un **test de dépistage**, tout autre enfant de la maisonnée, **âgé de moins de 5 ans**, doit aussi rester à la **maison, jusqu'au résultat du test**.



Après 24 heures d'observation à la maison :

Si mon enfant n'a plus de symptômes

Il peut retourner au service de garde 😊

Si mon enfant a encore au moins un symptôme

- Je remplis [l'outil d'autoévaluation en ligne en cliquant ici](#) ou j'appelle le 1 877 644 4545.
- Je respecte les consignes données.
- Si mon **enfant est identifié** par la santé publique comme un **contact étroit d'un cas confirmé** de COVID-19 ET qu'il a des **symptômes**, tous les membres de la maisonnée **considérés non protégés***, restent en isolement jusqu'au **résultat du test**.
- Les enfants **non protégés*** fréquentant un **service de garde** (0-5 ans) ou le **préscolaire** qui habitent sous le même toit que l'enfant symptomatique, **doivent s'isoler jusqu'au résultat du test**.

Je refuse le dépistage ?

Si mon enfant doit être dépisté pour la COVID-19, mais que **je refuse de le faire tester**, je dois le garder en **isolement à la maison** pendant une période minimale de **10 jours à partir du début de ses symptômes ET jusqu'à leur disparition**.



- Tous les membres de notre maisonnée doivent aussi s'isoler **au moins 10 jours** sauf s'ils sont **considérés protégés***.
- **Tous les membres** de notre maisonnée doivent surveiller leurs symptômes **pendant 14 jours**, qu'ils soient **considérés protégés*** ou non.

Mon enfant reçoit un résultat de test NÉGATIF

- Si ses **symptômes ont diminué** et qu'il présente un **bon état général**, il peut retourner au service de garde.
- Si mon enfant est identifié comme un **contact étroit d'un cas confirmé** de COVID-19, il doit **poursuivre son isolement** et les membres de la maisonnée **considérés protégés*** peuvent reprendre leurs activités.
- **Même si mon enfant a un résultat négatif** au test de la COVID-19, il **pourrait être exclu du service de garde, s'il présente des symptômes pour lesquels l'exclusion d'un enfant est habituellement recommandée** (autre que la COVID). Je peux me référer au **Tableau 3** du guide publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux : [Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et écoles du Québec](#).

Mon enfant reçoit un résultat de test POSITIF

- Vous serez contacté par la santé publique pour vous donner les consignes à suivre pour votre enfant et pour les membres de la maisonnée, **considérés non protégés***.

* Une personne est **considérée protégée** si elle remplit une des **3 conditions suivantes** :

- Elle a reçu 2 doses de vaccin, dont la deuxième il y a 7 jours ou plus, avec un intervalle d'au moins 21 jours entre les 2 doses.
- Elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par laboratoire il y a plus de 6 mois, et a reçu une dose de vaccin depuis 7 jours ou plus et au moins 21 jours après le début de la maladie.
- Elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par laboratoire depuis 6 mois ou moins.